

Tabla 2. **Recomendaciones para la vacunación de personas con vacunación previa** (indistintamente de la cantidad de dosis recibidas)

	Antecedente de vacunación	Esquema propuesto	Esquema alternativo*
5 a 17 años inclusive con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI, fístula de LCR o implante coclear	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	VPN23 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	
	VCN13 + VPN23	No requiere dosis adicional	
5 a 17 años con inmunocompromiso (HIC)	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 8 semanas	
	VCN13 + VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 5 años de última dosis	
18 a 64 años con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI	VCN13	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 12 meses	VPN23 1 dosis con intervalo ≥ 12 meses**
	VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 12 meses	
	VCN13 + VPN23	No requiere dosis adicional**	
18 a 64 años HIC, fístula de LCR y/o implante coclear	VCN13	VCN20 1 dosis	-
	VPN23	con intervalo ≥ 12 meses	-
	VCN13 + VPN23	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 5 años de última dosis	-
65 años y más	VCN13	VCN20 1 dosis	-
	VPN23	con intervalo ≥ 12 meses	-
	VCN13 + VPN23 recibidas antes o después de los 65 años	VCN20 1 dosis con intervalo ≥ 5 años de última dosis	-

HIC: Huéspedes inmunocomprometidos (tabla 1); VCN13: vacuna conjugada contra neumococo de 13 serotipos; VCN20: vacuna conjugada contra neumococo de 20 serotipos; VPN23: Vacuna polisacárida contra neumococo de 23 serotipos.

*Aquellas personas con enfermedades crónicas con riesgo aumentado de ENI que recibieron VCN13 previamente, pueden recibir como esquema alternativo la vacuna VPN23 si estuviera disponible, como se describe en esta columna. Se recomienda idealmente continuar esquema con VCN20 en personas con inmunocompromiso y mayores de 65 años.

** Aquellas personas de 18 a 64 años con riesgo aumentado de ENI que recibieron esquema secuencial VCN13-VPN23, se recomienda 1 (una) dosis de VCN20 a partir de los 65 años con un intervalo de al menos 5 años respecto a la última dosis de vacuna antineumocócica.

FUENTE: Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Lineamientos Técnicos y Manual de Vacunación Vacuna Antineumocócica Conjugada de 20 serotipos en mayores de 5 años. Abril 2024. P 15 y 16. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2018/02/lineamiento_tecnico_vcn20_2024.pdf